

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ- ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Ихтиол Реневал, 100 мг/г, мазь для наружного применения
Ихтиол Реневал, 200 мг/г, мазь для наружного применения

Действующее вещество: ихтиол (ихтаммол)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Ихтиол Реневал, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Ихтиол Реневал.
3. Применение препарата Ихтиол Реневал.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Ихтиол Реневал.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Ихтиол Реневал, и для чего его применяют

Действующим веществом препарата Ихтиол Реневал является ихтиол (ихтаммол). Это противовоспалительное средство для местного применения.

Показания к применению

Ихтиол Реневал применяют у взрослых и детей старше 12 лет при ожогах, воспалении, экземе, пиодермии (гнойничковое заболевание кожи) в том числе фурункулезе, стационарной и регрессирующей стадии псориаза.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Ихтиол Реневал

Противопоказания

Не применяйте препарат Ихтиол Реневал

- если у Вас аллергия (повышенная чувствительность) на ихтиол (ихтаммол) или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Ихтиол Реневал проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не наносите мазь на открытые раны, она предназначена только для наружного применения.

Не допускайте попадания мази на слизистые оболочки и в глаза.

После нанесения мази тщательно вымойте руки для предотвращения попадания мази в глаза, нос, рот.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте до 12 лет вследствие вероятной небезопасности.

Другие лекарственные препараты и препарат Ихтиол Реневал

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не применяйте препарат Ихтиол Реневал вместе с растворами солей йода, алкалоидами, солями тяжелых металлов, оксидом цинка.

Беременность, грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Применение препарата Ихтиол Реневал возможно во время беременности в случае, если эффективность от применения препарата для матери превышает риск возникновения побочных эффектов у плода или ребенка.

Грудное вскармливание

Применение препарата Ихтиол Реневал возможно в период грудного вскармливания в случае, если эффективность от применения препарата для матери превышает риск возникновения побочных эффектов у плода или ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата Ихтиол Реневал

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки, медицинской сестры. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом, или работником аптеки, или медицинской сестрой.

Рекомендуемая доза: взрослым и детям с 12 лет наносить тонким слоем на пораженные участки кожи. При необходимости использовать повязку.

Путь и способ введения

Наружно, 1-2 раза в день.

Продолжительность курса и особенности схемы лечения (и у детей, и у взрослых) необходимо согласовать с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Если Вы применили препарат Ихтиол Реневал больше, чем следовало

Если Вы применили большую дозу, чем Вам было назначено, обратитесь к своему врачу или в местную поликлинику, или больницу. Не забудьте

взять с собой упаковку лекарства, чтобы врачам было понятно, какое лекарство Вы применяли.

Случаев передозировки не описано.

Если Вы забыли применить препарат Ихтиол Реневал

Если Вы забыли применить препарат Ихтиол Реневал, не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную, примените следующую дозу в обычное время.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Ихтиол Реневал может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При возникновении следующих нежелательных реакций, следует сразу прекратить применение препарата и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Возможно покраснение кожи, зуд, сыпь (местные аллергические реакции).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листа-вкладыша. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (смотри ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 800 550-99-03

e-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Ихтиол Реневал

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе или банке после слов «годен до», картонной пачке после «годен до» или «EXP». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре ниже 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Ихтиол Реневал, содержит

Действующим веществом является ихтиол (ихтаммол).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) является вазелин.

Ихтиол Реневал, 100 мг/г, мазь для наружного применения

Каждый грамм содержит 100 миллиграмм ихтиола (ихтаммола).

Ихтиол Реневал, 200 мг/г, мазь для наружного применения

Каждый грамм содержит 200 миллиграмм ихтиола (ихтаммола).

Внешний вид препарата Ихтиол Реневал и содержимое его упаковки

Мазь для наружного применения.

Однородная мазь темно-коричневого цвета с характерным запахом.

По 25 г, 30 г в тубу алюминиевую, укупоренную колпачком навинчиваемым из полиэтилена низкого давления (бушоном), или в тубу полимерную из комбинированного материала (полиэтилен высокого давления/алюминий/полиэтилен низкого давления), укупоренную колпачком навинчиваемым из полипропилена (бушоном), или по 25 г в банку оранжевого стекла с треугольным венчиком, укупоренную крышкой натягиваемой из полиэтилена высокого давления с уплотняющим элементом.

На тубу алюминиевую, тубу полимерную текст и рисунок этикетки наносят печатными красками или наклеивают этикетки самоклеящиеся.

На банку наклеивают этикетку самоклеющуюся.

Тубу алюминиевую, или тубу полимерную, или банку с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем) помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Производитель

Выпускающий контроль качества

Российская Федерация

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Адрес: ул. Станционная, д. 80, г. Новосибирск, 630096 – Россия

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95

e-mail: pretenzii@pfr-obnovlenie.ru

Листок-вкладыш пересмотрен