

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ –

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Декспантенол Реневал, 50 мг/г,
мазь для наружного применения

Действующее вещество: декспантенол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к крахтнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Декспантенол Реневал, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Декспантенол Реневал.
3. Применение препарата Декспантенол Реневал.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Декспантенол Реневал.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Декспантенол Реневал, и для чего его применяют.

Действующим веществом препарата Декспантенол Реневал является декспантенол. Декспантенол относится к фармакотерапевтической группе: препараты для лечения ран и язв; препараты, способствующие нормальному рубцеванию; другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию. Декспантенол стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Показания к применению

- При нарушении целостности кожных покровов: заживление ожогов (в т.ч. солнечных), мелких повреждений кожи (садины, порезы, трещины и пр.);
- профилактика и лечение сухости кожи, в том числе и как последствие дерматитов различного генеза (проявляющихся шелушением, покраснением, раздражением, чувством стянутости), а также ежедневный уход за участками кожных покровов, подверженных наибольшему воздействию внешних факторов (лицо, руки);
- для ухода за молочной железой в период кормления грудью (лактации) (трещины и покраснение сосков молочной железы);
- для ухода за грудными детьми и младенцами (опрелость, «пеленочный» дерматит).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чём следует знать перед применением препарата Декспантенол Реневал.

Противопоказания

Не применяйте препарат Декспантенол Реневал:

- если у Вас аллергия на декспантенол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Декспантенол Реневал проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не допускайте попадания препарата в глаза или на слизистые оболочки.

Не наносите на мокнущие раны. Если Вы беременны или кормите грудью,

то не применяйте препарат на обширных участках.

Другие препараты и препарат Декспантенол Реневал

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Беременность, грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат Декспантенол Реневал можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Если вы кормите грудью и используете препарат для обработки трещин сосков, то его необходимо смыть перед кормлением грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься видами деятельности, которые требуют повышенной концентрации внимания и быстроты реакций.

Препарат Декспантенол Реневал содержит ланолин, цетиловый спирт, стеариловый спирт

Ланолин, цетиловый спирт, стеариловый спирт могут вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Применение препарата Декспантенол Реневал.

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений, посоветуйтесь с лечащим врачом, работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Наносите мазь 1-2 раза в день.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Наносите мазь тонким слоем на пораженный участок кожи, слегка втирай. В случае нанесения на инфицированную поверхность кожи, предварительно обработайте ее любым антисептиком.

Если Вы кормите грудью, то смазывайте поверхность соска мазью после каждого кормления грудью.

Грудным детям наносите мазь после каждой смены белья или водной

процедуры.

Продолжительность терапии

Длительность применения препарата определяет врач.

Если Вы применили препарата Декспантенол Реневал больше, чем следовало

Если Вы будете применять препарат в соответствии с листком-вкладышем, то передозировка маловероятна. Случаи передозировки не описаны.

Если Вы забыли применить препарат Декспантенол Реневал

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции.

Подобно всем лекарственным препаратам Декспантенол Реневал может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата возможны аллергические реакции, аллергические кожные реакции (например, контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, покраснение, сыть, крапивница, раздражение кожи).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (смотриите ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 800 550 99 03

e-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://www.roszdravnadzor.ru>

5. Хранение препарата Декспантенол Реневал.

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применять препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе алюминиевой, или тубе полимерной, или банке после слов «годен до», на картонной пачке после «годен до» или «EXP». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре ниже 25 °C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Препарат Декспантенол Реневал содержит

Действующим веществом является декспантенол.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются:

ланолин, парафин жидкий, вазелин, мицдаля масло, протегин, воск пчелиный белый, цетиловый спирт, стеариловый спирт, вода очищенная.

Внешний вид препарата Декспантенол Реневал и содержимое упаковки

Мазь для наружного применения.

Однородная мазь от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, с характерным запахом.

По 25 г, 30 г, 50 г, 100 г в тубу алюминиевую с укупорочными средствами из полизтилена низкого давления (колпачки – бушоны) или в тубу полимерную из комбинированного материала (полизтилен высокого давления /алюминий / полизтилен низкого давления) с укупорочными средствами из полипропилена (колпачки – бушоны или флип-топ), или по 30 г, 50 г в банку оранжевого стекла с треугольным венчиком, укупоренную крышкой натягиваемой из полизтилена высокого давления с уплотняющим элементом.

На тубу алюминиевую, тубу полимерную из комбинированного материала текст и рисунок этикетки наносят печатными красками или наклеивают этикетки самоклеящиеся.

На банку наклеивают этикетку самоклеящуюся.

Тубу алюминиевую или тубу полимерную из комбинированного материала, или банку с листком-вкладышем помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Держатель регистрационного удостоверения

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Производитель

Выпускающий контроль качества

Российская Федерация

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Заявка информации о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Адрес: ул. Станционная, д. 80, г. Новосибирск, 630096 – Россия

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95

e-mail: pretenzi@pfk-obnovlenie.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза: <http://ees.eaeunion.org/>