

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Перед приемом препарата полностью прочтите листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболеваний совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Левофлоксацин Реневал, и для чего его применяют.

- Действующим веществом препарата Левофлоксацин Реневал является левофлоксацин (антибиотик), который относится к группе препаратов под названием: «антибактериальные средства системного действия; производные хинолона; фторхинолоны».
- Показания к применению**
- Левофлоксацин Реневал показан к применению у взрослых в возрасте старше 18 лет для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными к левофлоксацину микрорганизмами:
- осложненные инфекции мочевыводящих путей и пиелонефрит;
 - хронический бактериальный простатит;
 - комплексное лечение лекарственно-устойчивых форм туберкулеза;
 - профилактика и лечение сибирской язвы при воздушно-капельном пути заражения;
 - госпитальная пневмония.

Для лечения следующих инфекционно-воспалительных заболеваний левофлоксацин может применяться только в качестве альтернативы другим противомикробным препаратам:

- внебольничная пневмония;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
- острый бактериальный синусит;
- обострение хронического бронхита;
- неосложненный цистит.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Левофлоксацин Реневал.

Противопоказания

Не принимайте препарат Левофлоксацин Реневал

- если у Вас аллергия на левофлоксацин или на другие хинолоны, или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша);
- если у Вас эпилепсия;
- если у Вас псевдогипераллергическая миастения (myasthenia gravis) (тип мышечной слабости);
- если у Вас когда-либо были случаи поражения сухожилий при приеме фторхиноловов;
- если Вам нет 18 лет;
- если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Левофлоксацин Реневал проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Вы не должны принимать фторхиноловы/хинолоны/антибактериальные препараты, включая Левофлоксацин Реневал, если в прошлом у Вас возникали серьезные нежелательные реакции при приеме хинолов или фторхинолов. В этом случае следует как можно скорее проинформировать лечащего врача.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем принимать Левофлоксацин Реневал:

- если у Вас есть предрасположенность к судорогам, имелись в прошлом поражения центральной нервной системы, такие как инсульт, тяжелая черепно-мозговая травма или Вы одновременно принимаете препараты, снижающие порог судорожной активности головного мозга (например, фенобуфен или теофилин), в таком случае у Вас могут возникнуть побочные эффекты со стороны центральной нервной системы. При возникновении судорог прекратите прием препарата Левофлоксацин Реневал и немедленно обратитесь к врачу;
- Вам 60 лет или больше;
- Вы принимаете глюкокортикоиды (см. раздел 2: «Другие лекарственные препараты и препарат Левофлоксацин Реневал»);
- Вам проведена операция по пересадке органа (трансплантация);
- если у Вас когда-либо была диагностирована периферическая нейропатия;
- если у Вас когда-либо были проблемы с почками (может потребоваться изменение дозы препарата);
- если у Вас когда-либо были проблемы с сердцем. Следует соблюдать осторожность, если у Вас врожденный (наследственный) синдром удлиненного интервала QT (что видно на электрокардиограмме (ЭКГ) или это наблюдалось у родственников в Вашей семье в прошлом); нарушения водно-электролитного баланса (например, гипокалиемия, гипомагниемия), значительное замедление сердечного ритма (брadiкардия), нарушение функции сердца (сердечная недостаточность), наличие инфаркта миокарда в прошлом. Вы же знали, или пояснил пациент, или Вы принимаете другие препараты, вызывающие изменения на ЭКГ (см. раздел 2: «Другие лекарственные препараты и препарат Левофлоксацин Реневал»);
- если у Вас или у Ваших родственников когда-либо были дефицит гликозо-6-фосфатдигидрогеназы, поскольку у Вас может возникнуть риск развития анемии при приеме левофлоксацина;
- если у Вас сахарный диабет, так как у Вас имеется риск развития гипогликемии при приеме левофлоксацина;
- если у Вас когда-либо были проблемы с психическим здоровьем;
- у Вас порfiria (при обострении порfirии);
- если у Вас было диагностировано увеличение или «расширение» крупного кровеносного сосуда (аневризма аорты или аневризма крупного периферического сосуда);
- если у Вас ранее был эпизод расслоения аорты (разрыв ее стенки);
- если у Вас или у Ваших родственников когда-либо были аневризма или расслоение аорты, врожденный порок клапана сердца (регургитация/недостаточность клапана сердца), а также другие факторы риска или предрасполагающие состояния (например, заболевания соединительной ткани, такие как синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса сосудистого типа, синдром Тернера, болезнь Бехчета, артериальная гипертензия, реуматоидный артрит, сосудистые заболевания, такие, как артерит Такасу, гигантоклеточный артрит, подтвержденный атеросклероз, синдром Шегрена, инфекционный эндокардит). Если Вы почувствовали **внезапную сильную боль в животе, груди или спине**, следует немедленно обратиться к врачу в отделение неотложной помощи.

Немедленно обратитесь к врачу, если заметите какие либо из следующих симптомов **во время лечения препаратом Левофлоксацин Реневал**. Врач рассмотрит необходимость прекращения приема препарата Левофлоксацин Реневал.

- **Тяжелая, внезапная аллергическая реакция** (анафилактическая реакция/шок, ангионевротический отек). Даже при применении первой дозы препарата есть вероятность того, что у Вас могут возникнуть серьезные аллергические реакции, имеющие следующие симптомы: чувство сдавленности в груди, головокружение, боль, слабость или головокружение приставании. **Если эти симптомы возникли, прекратите применение препарата Левофлоксацин Реневал и немедленно обратитесь к врачу.**
- **Серьезные кожные реакции**. При применении левофлоксацина сообщалось о серьезных кожных реакциях, включая синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некроз и лекарственную реакцию зосинофилии и системными симптомами (DRESS-синдром).

Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некроз могут первоначально проявляться на теле в виде красноватых пятен, похожих на мишины, или круглых пятен, частично сведенными в центр. Кроме того, могут возникать язвы по рту, горле, носу, половых органах и глазах (красные и опущенные глаза). Этим серьезным кожным высыпанием часто предшествуют лихорадка и/или гриппоподобные симптомы.

Сыпь может прогрессировать до обширного шелушения кожи и опасных для жизни осложнений или привести к летальному исходу.

DRESS-синдром первоначально проявляется в виде гриппоподобных симптомов и сыпи на лице, затем в виде продолжительной сыпи с высокой температурой тела, повышенным уровнем печеночных ферментов, выявляемых в анализах крови, а также увеличением количества лейкоцитов (эозинофилия) и увеличением лимфатических узлов.

Если у Вас **развилась серьезная сыпь или другие кожные симптомы, прекратите прием препарата Левофлоксацин Реневал и немедленно обратитесь к врачу** или обратитесь за медицинской помощью.

- Длительные, приводящие к инвалидности и потенциально необратимые серьезные нежелательные реакции. При применении фторхиноловов/хиноловых антибактериальных препаратов, в том числе препарата Левофлоксацин Реневал, отмечались очень редкие, но серьезные нежелательные реакции, некоторые из которых носили длительный характер (месяцы или годы), приводили к инвалидности или были потенциально необратимыми. Они включают боль в сухожилиях, мышцах и суставах, верхних и нижних конечностях, трудности при ходьбе, необычные ощущения, такие как покалывание, шекотание, онемение или жжение (парестезия),

Левофлоксацин Реневал, 250 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Левофлоксацин Реневал, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Левофлоксацин Реневал, 750 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: левофлоксацин

сенсорные расстройства, включая нарушение зрения, вкуса, обоняния и слуха; депрессию, ухудшение памяти, сильную истощаль и тяжелые нарушения сна. Если после приема препарата у Вас возникнет какая-либо из этих нежелательных реакций, **немедленно обратитесь к врачу**, прежде чем продолжать лечение препаратом. Ваш врач примет решение о дальнейшей терапии, рассмотрев возможность применения антибиотиков из другого класса.

- **Диарея** может возникнуть во время применения антибиотиков, в том числе препарата Левофлоксацин Реневал, или даже через несколько недель после прекращения лечения. В случае тяжелой или длительной диареи, или если Вы заметили, что в Вашем стуле есть кровь или слизь, прекратите прием препарата и немедленно сообщите об этом врачу, поскольку данное состояние может быть опасно для жизни. Не принимайте препараты, которые останавливают или замедляют опорожнение кишечника.

• **Боль и отек в суставах, воспаление и разрыв сухожилий** могут отмечаться в редких случаях. Вы подвергены повышенному риску, если Вы пожилой человек (старше 60 лет), перенесли трансплантацию органа, имеете проблемы с почками или одновременно принимаете глюкокортикоиды (гормональные препараты). Воспаление и разрыв сухожилий могут возникать как в первые 48 часов после начала терапии, так и через несколько месяцев после прекращения терапии препаратом Левофлоксацин Реневал. При первых признаках воспаления сухожилий или болевом синдроме (например, в области лодыжек, запястий, локтей, плеч или колена), прекратите прием препарата, обратитесь к врачу и обеспечьте покой в области болезненного участка. Избегайте любой неожиданной нагрузки, так как это может увеличить риск разрыва сухожилий.

• В редких случаях могут появляться **симптомы повреждения нервов** (нейропатия), такие как боль, жжение, покалывание, онемение или слабость, особенно в ступнях ног или ладонях рук. Если это произойдет, прекратите прием препарата Левофлоксацин Реневал и немедленно сообщите об этом лечащему врачу, чтобы предотвратить развитие возможных необратимых последствий.

• Даже после первого приема препарата Левофлоксацин Реневал могут возникнуть психические нарушения. Если у Вас **депрессия** или **психоз**, симптомы данных заболеваний на фоне терапии препаратом Левофлоксацин Реневал могут усугубляться в редких случаях – прогрессировать до мыслей о самоубийстве, самоубийства или его попытки. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу.

• Антибиотики из группы фторхиноловов могут вызвать **повышение содержания сахара в крови выше нормального уровня** (гипергликемия) или **понижение содержания сахара в крови ниже нормального уровня** (гипогликемия), что в тяжелых случаях может привести к потере сознания (гипогликемическая кома) (см. раздел 4: «Возможные нежелательные реакции»). Это особенно важно для пациентов с сахарным диабетом. Если у Вас сахарный диабет, то следует тщательно контролировать содержание сахара в крови.

• Когда Вы принимаете препарат Левофлоксацин Реневал, Ваша кожа становится более **чувствительной к солнечному свету и ультрафиолетовому излучению**. Поэтому не подвергайте себя воздействию сильного солнечного света или искусственного ультрафиолета, например, солярия.

• Левофлоксацин может вызвать **повреждение печени**. Если Вы заметили такие симптомы, как потеря аппетита, жуткое (пожелтение кожи), темная моча, зуд или болезненность в области желудка, немедленно обратитесь к врачу.

• Левофлоксацин может вызвать **нарушение зрения**. При любых нарушениях зрения немедленно обратитесь к врачу.

• Сообщите врачу или персоналу лаборатории, что Вы принимаете препарат Левофлоксацин Реневал, если Вам нужно сдать **анализ мочи** или провести **бактериологическую диагностику туберкулеза**.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям и подросткам в возрасте до 18 лет, в связи с незавершенностью роста скелета, так как нельзя полностью исключить риск поражения хрящевых зон роста костей.

Другие препараты и препарат Левофлоксацин Реневал

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете:

Это связано с тем, что Левофлоксацин Реневал может влиять на действие некоторых других лекарств. Такие некоторые лекарства могут влиять на действие Левофлоксацин Реневал. В частности, совместное применение с Левофлоксацин Реневал каких-либо из следующих лекарств может увеличить вероятность побочных эффектов:

• Глюкокортикоиды (для лечения воспаления). Одновременный прием повышает риск развития гипергликемии.

• Варфарин (для разжижения крови). Одновременный прием повышает риск кровотечений. Вам может потребоваться регулярно сдавать анализ крови, чтобы Ваш врач мог проверить, насколько хорошо Ваша кровь может сгущаться.

• Теофилин (для лечения проблем с дыханием). Одновременный прием повышает риск развития судорог.

• Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как фенобуфен и другие НПВП, снижающие порог судорожной активности головного мозга (при болях и воспалении). Одновременный прием повышает риск развития судорог.

• Циклоспорин (при кожных заболеваниях, ревматоидном артите и после трансплантации органов). Одновременный прием повышает риск развития неожелательных реакций циклоспорина.

• Другие препараты, которые могут изменить ритм сердца. Сюда входят лекарства, применяемые при нарушениях сердечного ритма (антиаритмические средства, такие как хинидин, гидрохинидин, дизопирамид, сotalол, дофетидил, ибутилрид и амиодарон), при депрессии (трициклические антидепрессанты, такие как амитриптилин и имипрамин), при психических расстройствах (нейролептики) и при бактериальных инфекциях («макролидные» антибиотики, такие как эритромицин, азtreомицин и кларитромицин). Одновременный прием повышает вероятность удлинения интервала QT на ЭКГ.

• Пробенецид (для лечения подагры) и циметидин (при избытке пищеварительного тракта и изжоге). Следует соблюдать особую осторожность при приеме любого из этих препаратов вместе с Левофлоксацин Реневал. Если у Вас есть проблемы с почками, Ваш врач может назначить Вам более низкую дозу препарата.

Не принимайте таблетки Левофлоксацин Реневал одновременно с последующими лекарствами. Это связано с тем, что это может повлиять на эффективность Левофлоксацин Реневал:

• таблетки железа (при анемии), добавки цинка, антиациды, содержащие магний или алюминий (при повышенной кислотности или изжоге), диданозин или суральфат (при язве желудка) (см. раздел 3).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы **беремены или кормите грудью**, думаете, что забеременели, или планируете **беременность**, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не принимайте препарат Левофлоксацин Реневал во время беременности.

Не принимайте препарат Левофлоксацин Реневал, если Вы кормите грудью, поскольку Левофлоксацин выделяется с грудным молоком и может настичь вред Вашему ребенку.

Управление транспортными средствами и работы с механизмами

После приема препарата Левофлоксацин Реневал у Вас могут возникнуть нежелательные реакции, включая головокружение, сонливость, ощущение вращения (вертиго) или нарушение зрения. Эти нежелательные реакции могут повлиять на Вашу способность концентрироваться и скорость Вашей реакции. В этом случае не садитесь за руль, и не выполняйте работу, требующую повышенного внимания.

Препарат Левофлоксацин Реневал содержит лактозу

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. Применение препарата Левофлоксацин Реневал

Всё время принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появление сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая суточная доза:

• Осложненные инфекции мочевыводящих путей:

– по 2 таблетки препарата Левофлоксацин Реневал 250 мг, 1 раз в сутки;
или по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 500 мг, 1 раз в сутки;
или по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 750 мг, 1 раз в сутки.

• Гиперчувствительность к антибиотикам:

– по 2 таблетки препарата Левофлоксацин Реневал 250 мг, 1 раз в сутки;
или по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 500 мг, 1 раз в сутки;

• Комплексное лечение лекарственно-устойчивых форм туберкулеза:

– по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 500 мг, 1-2 раза в сутки.

• Гиперчувствительность к антибиотикам:

– по 2 таблетки препарата Левофлоксацин Реневал 250 мг, 1 раз в сутки;

• Внебольничная пневмония:

– по 2 таблетки препарата Левофлоксацин Реневал 250 мг, 1-2 раза в сутки;

• или по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 500 мг, 1-2 раза в сутки;

• или по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 750 мг, 1 раз в сутки.

• Госпитальная пневмония:

– по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 750 мг, 1 раз в сутки.

• Осложненные инфекции кожных покровов и мягких тканей:

– по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 750 мг, 1 раз в сутки.

• Синдром Стивенса-Джонсона:

– по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 750 мг, 1 раз в сутки.

• Гиперчувствительность к антибиотикам:

– по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 750 мг, 1 раз в сутки.

• Гиперчувствительность к антибиотикам:

– по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 750 мг, 1 раз в сутки.

по 2 таблетки препарата Левофлоксацин Реневал 250 мг, 1-2 раза в сутки; или по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 500 мг, 1-2 раза в сутки; или по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 750 мг, 1 раз в сутки.

Острый бактериальный синусит:

по 2 таблетки препарата Левофлоксацин Реневал 250 мг, 1 раз в сутки;

или по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 500 мг, 1 раз в сутки;

или по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 750 мг, 1 раз в сутки.

Обострение хронического бронхита:

по 2 таблетки препарата Левофлоксацин Реневал 250 мг, 1 раз в сутки;

или по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 500 мг, 1 раз в сутки.

Несложенный цистит:

по 1 таблетке препарата Левофлоксацин Реневал 250 мг, 1 раз в сутки.

Лечящий врач обясняет Вам, какую дозу препарата Левофлоксацин Реневал Вам следует принимать, а также как часто и в течение какого времени. Этому будет зависеть от типа и тяжести инфекции.

Сообщите врачу, если у Вас есть заболевания почек, так как может потребоваться изменение дозы препарата.

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. Проконсультируйтесь с врачом, если Вы не знаете, сколько таблеток препарата Левофлоксацин Реневал Вам следует принимать и как долго.

Способ применения

• Применяйте препарат внутрь.

• Проглатывайте таблетки целиком, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости (от 0,5 до 1 стакана).

• Стартуйте принимать таблетки 1 или 2 раза в сутки в одиночное время.

• Вы можете принимать таблетки перед едой или независимо от приема пищи.

• При необходимости таблетки препарата Левофлоксацин Реневал 250 мг и 500 мг можно разделить на равные дозы по риске. На таблетках препарата Левофлоксацин Реневал 750 мг риска нанесена лишь для облегчения разливания таблетки при возникновении затруднений при ее проглатывании целиком. Разламывать таблетку по нанесенной риске.

• Применяйте препарат Левофлоксацин Реневал не менее чем за 2 часа до или через 2 часа после приема препаратов, содержащих магний и/или алюминий, железо, цинк, диадизонин или сурфактант.

Если Вы пришли к препарату Левофлоксацин Реневал больше, чем следовало

Если Вы приняли больше назначенной дозы, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если возможно, возьмите таблетки или коробку с препаратом с собой, чтобы показать врачу. При передозировке могут наблюдаться такие эффекты, как нарушение сознания, включая спутанность сознания, судороги, галлюцинации, трепет и тошнота.

Если Вы забыли принять препарат Левофлоксацин Реневал

Если Вы случайно пропустили прием препарата, то следует, как можно скорее принять очередную дозу и далее продолжать прием согласно рекомендованному режиму дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Левофлоксацин Реневал

Важно окончить курс лечения, даже если через несколько дней Вы почувствуете себя лучше. Если Вы прекратите принимать препарат слишком рано, инфекционное заболевание может быть не полностью вылечено и его симптомы могут возратиться или ухудшиться. У Вас может также развиваться снижение чувствительности (резистентности) антибиотикам.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Левофлоксацин Реневал может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не всегда.

Прекратите прием препарата Левофлоксацин Реневал и немедленно обратитесь к врачу, если заметите, какой-либо из следующих серьезных побочных эффектов – Вам может потребоваться срочная медицинская помощь:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

• судороги (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»);

• внезапная сильная боль в животе, груди или спине (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»);

• мышечная слабость, воспаление сухожилий, что может привести к разрыву сухожилий, особенно большого сухожилия на задней части лодыжки (ахиллов сухожилие) (поражение сухожилий, тендинит, мышечная слабость) (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»);

• лекарственная реакция, сопровождающаяся такими симптомами, как сильные, лихорадка, воспаление внутренних органов, гематологические нарушения и системные проявления (реакции гиперчувствительности, проявляющиеся эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), фиксированное лекарственное воспаление) (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»);

• мышечная слабость, воспаление сухожилий, что может привести к разрыву сухожилий, особенно большого сухожилия на задней части лодыжки (ахиллов сухожилие) (поражение сухожилий, тендинит, мышечная слабость) (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»);

• тяжелая, внезапная аллергическая реакция с такими симптомами, как стеснение в груди, головокружение; тошнота или слабость, или головокружение при вставании (анафилактическая реакция/ишок) (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»);

• сердцебatto, опасная для жизни кожная сыпь, обычно в виде пузырей или язв на слизистой оболочке ротовой полости, носа, глаз, половых органов, которая может широко распространяться по всей поверхности кожи, приводя к ее отслойению (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некроз) (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»); кожная сыпь, пропаивающаяся пятнами синево-красного цвета, папулами, везикулами и эрозиями (экссудативная мультиформная эритема);

• необычные ощущения, такие как боль, жжение, покалывание, онемение и/или слабость в конечностях (периферическая сенсорная нейропатия, периферическая сенсорно-моторная нейропатия) (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»);

• внезапная сильная боль в животе, груди или спине (признаки развития аневризмы или расслоения аорты, осложненные разрывом аорты);

• водянка диареи с примесью крови, возможно, с желудочными спазмами и высокой температурой. Это могут быть признаки серьезных проблем с кишечником (реморгическая диарея, энтероколит, псевдомембранный колит). (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»);

• потеря аппетита, желтое окрашивание кожи и глаз, моча темного цвета, зуд или болезненность в желудке (желтуха). Это могут быть признаки проблем с печенью, которые могут включать недостаточность печени (старческая печеночная недостаточность, гепатит) (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»).

Другие побочные эффекты, которые наблюдались при лечении препаратом Левофлоксацин Реневал, перечислены ниже по вероятности их развития:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

• бессонница;

• головная боль, головокружение;

• диарея, рвота, тошнота;

• повышение активности «печечночных» ферментов в крови (например, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ)), повышение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) и гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ).
Несколько (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

• грибковые инфекции, развитие устойчивости (резистентности) болезнестворных (патогенных) микробионизмов;

• уменьшение количества лейкоцитов в крови (лейкопения), увеличение количества эозинофилов в крови (эозинофилия);

• анорексия;

• чувство беспокойства, тревога, спутанность сознания;

• сонливость, трепет, извержение вкуса (дисгевия);

• чувство отключения или кружения или собственного тела или окружающих предметов (вертиго);

• одышка;

• боли в животе, расстройство пищеварения (диспепсия), избыточное скопление газов в кишечнике (метеоризм), запор;

• повышенная концентрация билирубина в крови;

• сыпь, зуд, крапивница, повышенное потоотделение (гипергидроз);

• суставная боль (артралгия), боль в мышцах (миалгия);

• повышенная концентрация креатинина в крови;

• повышенная утомляемость с неустойчивым настроением, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимость громких звуков, яркого света, резких запахов (астения);

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

• уменьшение количества нейтрофилов в крови (нейтропения), уменьшение количества тромбоцитов в крови (thrombocytopenia);

• отек лица, губ, рта, языка или горла, затрудненное дыхание (ангина-бронхитический отек);

• временный высыпания антидиуретического гормона (синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона);

• «полчи» аппетит, нервозность, испарина, дрожь (гипогликемия);

• психических нарушений (например, галлюцинации, паранойя), депрессия, возбуждение (ажитация), нарушение сна, ночные кошмары;

• нарушения зрения, такие как расплывчатость видимого изображения;

• звон в ушах;

• увеличение частоты сердечных сокращений (синусовая тахикардия), ощущение сердцебиения;

• острая почечная недостаточность (например, вследствие развития интерстициального нефрита);

• повышение температуры тела (тиреоксиаз);

• Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

• приступы порфирии (очень редкая болезнь обмена веществ, характеризующаяся нарушением обмена пигментов у пациентов с порфирией).

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоты возникновения определить невозможно):

• уменьшение количества всех форменных элементов в крови (анемия), отсутствие или резкое уменьшение количества гранулоцитов в крови (агранулоцитоз), ускоренное разрушение эритроцитов/красных кровяных телец (гемолитическая анемия);

• понижение содержания сахара в крови (гипогликемия), понижение содержания сахара в крови (тизяка, гипогликемия), вплоть до развития гипогликемической комы (особенно у пожилых пациентов, у пациентов с сахарным диабетом, принимающих пероральные гипогликемические средства или получающих лечение инсулином) (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»);

• нарушения психики с нарушениями поведения с причинением себе вреда, включая суицидальные мысли и суицидальные попытки, нервозность, нарушения памяти, нарушение сознания, восприятия, мышление (делирий) (включая нарушение внимания, дезориентацию);

• двигательные нарушения (дискинезия, экстрапирамидные расстройства), потеря вкусовых ощущений (агевсия), расстройство ощущения запаха, особенно субъективное ощущение запаха объективно отсутствующего (паросмия), включая потерю обоняния; обморок, повышение внутричерепного давления (доброточная гипертензия, псевдоапоплексия);

• прходящая потеря зрения, «туман» перед глазами, ухудшение зрения, покраснение глаз, светобоязнь и слезотечение (увейт);

• снижение слуха, потеря слуха;

• удлинение интервала QT, желудочковые нарушения ритма, повышение частоты сердечных сокращений (желудочковая тахикардия, желудочковая тахикардия типа «пирэт»), которые могут привести к остановке сердца (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»);

• внезапное счастливое дыхание, боль в груди, одышка или затрудненное дыхание (бронхоспазм), кашель одышка, недомогание; повышение температуры тела (аллергический пневмонит);

• боли в животе и спине, сопровождающиеся очень плохим самочувствием (пракрити);

• повышенная чувствительность к солнечному и ультрафиолетовому излучению (реакции фоточувствительности) (см. раздел 2: «Специальные указания и меры предосторожности»);

• сырье в виде багето-красных пятен, боль, судороги преимущественно на ногах (лейкоцитокластический васкулит);

• появление «языочек» в полости рта (стоматит);

• мышечные боли, спасти, рвота и спутанность сознания (рабдомиолиз), разрыв сухожилия, разрыв связок, разрыв мышц, артрит.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникнут какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-кладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 800 550-99-03

Эл. почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <http://www.roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Левофлоксацин Реневал

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на контурной ячейковой упаковке, после слов «годен до», картонной пачки после «годен до» или «ЕРХ». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 30°c.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (униожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Левофлоксацин Реневал содержит

Действующим веществом является левофлоксацин.

Левофлоксацин Реневал, 250 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 250 мг левофлоксацина (в виде гемигидрата).

Левофлоксацин Реневал, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 500 мг левофлоксацина (в виде гемигидрата).

Левофлоксацин Реневал, 750 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 750 мг левофлоксацина (в виде гемигидрата).

Препарат Левофлоксацин Реневал содержит лактозу (в виде моногидрата) (см. раздел 2 листка-кладыши).

Помимо ингредиентами (вспомогательными веществами) являются целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилкрахмал натрия, пovidон K30, кроскарбамидоза натрия, магния стеарат, кремний диоксид коллоидный (азороси); состав оболочки: [гипромелоза (E 464); лактоза моногидрат; титана диоксид (E 171); триасетин; краситель железа оксид красный (E 172)] или [сухая смесь для пленочного покрытия Оладрий II 32K240050 розовый, состоящая из: гипромелоза (E 464); лактоза моногидрат, титана диоксид (E 171), триасетин, краситель железа оксид красный (E 172)].

Внешний вид препарата Левофлоксацин Реневал и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Левофлоксацин Реневал, 250 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-розового до розового цвета, с риской на одной стороне. Допускается шероховатость поверхности. На поперечном разрезе ярко от светло-желтого до желтого цвета.

Таблетки можно разделить на равные дозы.

Левофлоксацин Реневал, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-розового до розового цвета, с риской на одной стороне. Допускается шероховатость поверхности. На поперечном разрезе ярко от светло-желтого до желтого цвета.

Линия разлома (риска) предназначена лишь для размывания с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

По 5, 10, 14 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фолги алюминиевой.

1, 2 контурные ячейковые упаковки по 5 или 7 таблеток или 1 контурная ячейковая упаковка по 10 или 14 таблеток с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем) помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, Комиссара Затькова, д.18.

Тел./факс: 8(800) 200-09-95.

Производитель

Выпускающий контроль качества

Российская Федерация

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Адрес: ул. Станционная, д. 80, г. Новосибирск, 630096 Россия

Тел./факс: 8(800) 200-09-95

e-mail: prtenet@pfk-obnovlenie.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза: <http://eec.eaeunion.org/>

