

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

• Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.

• Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

• Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

• Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

• Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

#### **Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Троксерутин Реневал, и для чего его применяют.

2. О чём следует знать перед применением препарата Троксерутин Реневал.

3. Применение препарата Троксерутин Реневал.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Троксерутин Реневал.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Троксерутин Реневал, и для чего его применяют.**

Действующим веществом препарата Троксерутин Реневал является троксерутин. Это венотонизирующее и венопротекторное средство.

#### **Показания к применению**

Троксерутин Реневал показан к применению у пациентов в возрасте старше 18 лет.

- Варикозное расширение вен;

- хроническая венозная недостаточность с такими проявлениями, как отеки, боли, ощущение тяжести в ногах;

- поверхностный тромбофлебит, перифлебит, флеботромбоз;

- посттромботический синдром;

- посттромботический отек, гематомы;

- профилактика осложнений после операций на венах.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О чём следует знать перед применением препарата Троксерутин Реневал.**

#### **Противопоказания**

**Не применяйте препарат Троксерутин Реневал:**

• если у Вас аллергия на троксерутин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

• если у Вас есть повреждения кожи (нарушения целостности кожных покровов);

• если Вы беременны (I триместр);

• если Вы кормите грудью;

• если Вам нет 18 лет.

#### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Троксерутин Реневал проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Наносите гель только на неповрежденную поверхность. Избегайте попадания геля на открытые раны, в глаза и на

слизистые оболочки! После нанесения препарата вымойте руки. Если Вам поставили диагноз «хроническая венозная недостаточность» Ваш лечащий врач может рекомендовать Вам применение препарата как в начальных, так и в поздних стадиях заболевания.

При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в том числе при склерозине, гриппе, кори, аллергических реакциях), применяйте в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта.

Не превышайте максимальные сроки и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата. В случае отсутствия уменьшения симптомов или при утяжелении симптомов заболевания обратитесь к врачу.

#### **Дети и подростки**

Не применяйте препарат Троксерутин Реневал детям в возрасте от 0 до 18 лет по всем показаниям. Данные отсутствуют.

#### **Другие препараты и препарат Троксерутин Реневал**

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Нет данных о взаимодействии троксерутина в данной лекарственной форме и других лекарственных средств.

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

#### **Беременность**

Не применяйте препарат Троксерутин Реневал в I триместре беременности.

Перед применением препарата во II и III триместрах беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Во II и III триместрах беременности применение препарата возможно лишь в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

#### **Грудное вскармливание**

Не применяйте препарат Троксерутин Реневал в период грудного вскармливания.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с механизмами, работа диспетчера и оператора).

**Препарат Троксерутин Реневал содержит бензалкокония хлорид**

Раздражитель, может вызывать кожные реакции.

#### **3. Применение препарата Троксерутин Реневал.**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемая доза:**

Доза препарата зависит от площади поврежденной поверхности, но не должна превышать 3–4 см геля (1,5–2 г).

#### **Путь (или) способ введения**

Наружно.

Наносите гель утром и вечером на область поражения с помощью легких массирующих движений снизу вверх до его полного впитывания в кожу. При необходимости Вы можете нанести гель под оклюзионную повязку.

## **Продолжительность терапии**

Курс лечения – от 2 недель до 1–2 месяцев. При рецидиве заболевания курс лечения можно повторить 2–3 раза в год.

Если через 6–7 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, проконсультируйтесь с врачом.

## **Если Вы применили препарата Троксерутин Реневал больше, чем следовало**

Если Вы применили большую дозу, чем Вам было назначено, обратитесь к врачу или в местную поликлинику или больницу. Не забудьте взять с собой упаковку лекарства, чтобы врачам было понятно, какое лекарство Вы применили.

Случаи передозировки при местном применении троксерутина не описаны.

При случайном проглатывании препарата возможны ощущение жжения в полости рта, слюнотечение, тошнота, рвота.

При случайном проглатывании препарата промойте полость рта и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

## **Если Вы забыли применить препарат Троксерутин Реневал**

Если Вы по каким-либо причинам пропустили применение препарата, Вы можете нанести его в любое время, соблюдая интервал между двумя сеансами лечения не менее 10–12 часов. Если Вы забыли применить препарат Троксерутин Реневал, не применяйте двойную дозу для компенсации пропущенной, примените следующую дозу в обычное время.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

## **4. Возможные нежелательные реакции.**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Троксерутин Реневал может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Троксерутин Реневал и немедленно обратитесь к врачу, если заметите какой-либо из следующих побочных эффектов: покраснение кожи (кожных покровов), зуд, сыпь, заболевание кожи (экзema), воспаление кожи (дерматит), сыпь, похожая на ожоги от крапивы (крапивница) – это может свидетельствовать об аллергической реакции.

Эти симптомы быстро проходят после прекращения лечения.

## **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 800 550-99-03

e-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

## **5. Хранение препарата Троксерутин Реневал.**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе алюминиевой или тубе полимерной после слов «годен до», на картонной пачке после «годен до» или «EXP».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре ниже 25 °C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения.**

### **Препарат Троксерутин Реневал содержит**

Действующим веществом является троксерутин.

Каждый грамм геля содержит 20 миллиграмм троксерутина.

Препарат Троксерутин Реневал содержит бензалкония хлорид (см. раздел 2 листка-вкладыша).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются троламин (триэтаноламин), карбомер (карбопол 940), бензалкония хлорид, динатрия эдэтат, вода очищенная.

## **Внешний вид препарата Троксерутин Реневал и содержимое упаковки**

Гель для наружного применения.

Однородный прозрачный гель от желтого до желто-зеленого цвета.

По 35 г, 40 г, 45 г, 50 г, 100 г в тубу алюминиевую с укупорочными средствами из полиэтилена низкого давления (колпачки-бушоны) или в тубу полимерную из комбинированного материала (полиэтилен высокого давления / алюминий / полипропилен низкого давления) с укупорочными средствами из полипропилена (колпачки –бушоны или флип-топ).

На тубу алюминиевую, тубу полимерную из комбинированного материала текст и рисунок этикетки наносят печатными красками или наклеивают этикетки самоклеящиеся.

Тубу алюминиевую или тубу полимерную из комбинированного материала с листком-вкладышем помещают в пачку из картона для потребительской тары.

## **Держатель регистрационного удостоверения**

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью «ПФКО-1»

Юридический адрес: 630096, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Станционная, дом 80, этаж 1, помещение 4.

## **Производитель**

Выпускающий контроль качества

Российская Федерация

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Адрес: ул. Станционная, д. 80, г. Новосибирск, 630096 – Россия

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95

e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

## **Листок-вкладыш пересмотрен**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на сайте Союза: <http://eesc.eaeunion.org/>